

Příbalová informace: informace pro pacienta

Panadol Rapide potahované tablety paracetamol

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud horečka neklesne do 3 dnů a bolest se nezmírní do 5 dnů nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Panadol Rapide a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panadol Rapide užívat
3. Jak se přípravek Panadol Rapide užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Panadol Rapide uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Panadol Rapide a k čemu se používá

Přípravek Panadol Rapide obsahuje paracetamol, léčivou látku tlumící bolest a horečku.

Složení tablet umožňuje, že paracetamol přechází do krevního oběhu nejméně dvakrát rychleji než ze standardní tablety s obsahem paracetamolu, a tak začíná i účinkovat rychleji.

Přípravek Panadol Rapide je určen k úlevě při mírných až středně silných bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů a bolestech při menstruaci. Panadol Rapide též přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení, jako jsou bolesti svalů, kloubů a bolesti v krku a snižuje horečku.

Po poradě s lékařem se přípravek může užívat i dlouhodobě k potlačení bolesti u některých revmatických onemocnění, např. artróze (degenerativní kloubní onemocnění) a při neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu).

Je vhodný pro dospělé a dospívající od 12 let.

Pokud horečka neklesne do 3 dnů a bolest se nezmírní do 5 dnů nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Tento lék nežívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panadol rapide užívat

Nežívejte přípravek Panadol Rapide:

- jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže máte závažné onemocnění jater nebo akutní žloutenku.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Panadol Rapide se poraďte se svým lékařem:

- jestliže se léčíte s onemocněním jater nebo ledvin
- jestliže máte hemolytickou anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek)
- jestliže máte nedostatek určitého enzymu (deficit glukóza-6-fosfátdehydrogenázy)
- jestliže máte problémy s konzumací alkoholu

Při užívání přípravku Panadol Rapide je rovněž třeba zvláštní opatrnosti, jestliže:

- máte závažnou infekci, protože ta může vést ke zvýšení rizika metabolické acidózy. Příznaky metabolické acidózy jsou:
 - hluboké, zrychlené, obtížné dýchání
 - nevolnost (pocit na zvracení), zvracení
 - ztráta chuti k jídlu

Pokud se u Vás objeví kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.

Přípravek Panadol Rapide obsahuje paracetamol, nežívejte jej současně s jinými léky obsahujícími paracetamol.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Během léčby tímto přípravkem nesmíte pít alkoholické nápoje.

Děti a dospívající

Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek Panadol Rapide určen dětem do 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Panadol Rapide

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Poradte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Panadol Rapide užívat, zejména jestliže:

- užíváte warfarin nebo jiné léky k prevenci srážení krve
- užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení
- užíváte cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu
- užíváte zidovudin (k léčbě infekce HIV)
- užíváte isoniazid (k léčbě tuberkulózy)

- užíváte chloramfenikol (antibiotikum)
- užíváte lamotrigin (k léčbě epilepsie).

Současné užívání Panadolu Rapide s některými léky na spaní, proti epilepsii a některými antibiotiky může vést v některých případech k poškození funkce jater. Současné dlouhodobé užívání Panadolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin.

Přípravek Panadol Rapide s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby přípravkem Panadol Rapide je třeba se vyvarovat konzumaci alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Panadol Rapide nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Panadol Rapide obsahuje sodík

Jedna tableta přípravku Panadol Rapide obsahuje 173 mg sodíku. V případě, že držíte dietu s nízkým obsahem sodíku, přípravek neužívejte.

3. Jak se přípravek Panadol Rapide užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí (včetně starších osob) a dospívající od 15 let

1 - 2 tablety až 4krát denně dle potřeby v časovém odstupu nejméně 4 hodiny. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg. Nejvyšší jednotlivá dávka je 2 tablety.

Neužívejte více než 8 tablet během 24 hodin.

Tuto dávku neužívejte déle než 5 dní. Při dlouhodobém užívání by dávka za 24 hodin neměla překročit 2,5 g paracetamolu (tj 5 tablet Panadolu Rapide).

Dospívající od 12 do 15 let

1 tableta v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. Nepodávejte více než 6 tablet během 24 hodin.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Pokud horečka neklesne do 3 dnů a bolest se nezmírní do 5 dnů nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Tento lék neužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Panadol Rapide, než jste měl(a)

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte přesně, jaké množství přípravku jste užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci.

Předávkování paracetamolem může způsobit závažné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panadol Rapide

Vezměte si jednu dávku, když si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ukončete léčbu tímto přípravkem a neprodleně vyhledejte lékaře:

- jestliže se u Vás objeví alergická reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy spojená s problémy s dýcháním nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje
- jestliže se u Vás objeví kožní vyrážka nebo olupování kůže, nebo vředy v ústech
- jestliže jste v minulosti měl(a) problémy s dýcháním po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků a stejné příznaky se u Vás objevily po užití tohoto přípravku
- jestliže se u Vás dojde k nevysvětlitelné tvorbě modřin

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).

Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby z 10 000).

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky, které se mohou objevit v průběhu léčby tímto přípravkem, jsou bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem, porucha funkce jater, selhání jater, žloutenka a změny krevního obrazu. Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Panadol Rapide uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Panadol Rapide obsahuje

- Léčivou látkou je paracetamol 500 mg v jedné potahované tabletě.
- Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, povidon 25, kalium-sorbát, předbobtnalý kukuřičný škrob, hydrogenuhličitan sodný, mikrokrytalická celulóza, magnesium-stearát, karnaubský vosk, potahová soustava opadry bílá II Y-22-7719 bílá (obsahuje oxid titaničitý (E 171), polydextrosu, hypromelosu, triacetin, makrogol).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 173 mg sodíku.

Jak přípravek Panadol Rapide vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety, z jedné strany vyraženo "P".

Balení: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.,
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika
email: cz.info@gsk.com

Výrobce

GlaxoSmithKline (Dungarvan) Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

3.8.2016